



คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

# Interhospital Conference

**Nootwadee Wankaew, MD**

**Division of Infectious Diseases**

**Department of Pediatrics**

**Faculty of Medicine Siriraj Hospital**





# History



- เด็กชายไทยอายุ 10 ปี
- ภูมิลำเนา จังหวัดนนทบุรี
- อาการสำคัญ : ไข้สูง ชาขาบวมแดงร้อนมา 1 วัน



# History

1 วันก่อน มีอาการไข้สูงหนาวสั่น ชาขาบวมแดง ร้อน จับแล้วเจ็บ เดินลำบากเพราะเจ็บขาขวา ไม่มีอาการปวดข้อ ไม่มีไอ ไม่มีน้ำมูก ไม่หอบ แต่อ่อนเพลีย รับประทานอาหารได้น้อย ไม่มีถ่ายเหลว ไม่มีปัสสาวะแสบขัด อาการอื่นปกติ ยังไม่ได้ไปรักษาที่ใดมาก่อน



# History

- ประวัติอดีต :

- คลอดครบกำหนด ขณะตั้งครรภ์มารดาแข็งแรงดี ผลฝากครรภ์ปกติ

- แรกเกิดมีขาขวาใหญ่กว่าขาซ้าย แต่อาการอื่นๆ ปกติ จนเริ่มมีอาการชักเกร็งบ่อยๆ เมื่ออายุ 9 ปี จึงมาโรงพยาบาลศิริราช และติดตามการรักษาที่แผนกกุมารเวชกรรมและศัลยกรรมมาตลอด ตรวจพบมีโรคประจำตัว คือ

- 1) Tuberosus sclerosis with epilepsy

ล่าสุด on Valproic acid (500) 1 ½ tab เช้า และ 1 tab เย็น

- 2) Incomplete lymphatic obstruction of right leg

มี plan ทำ lymphovenous anastomosis



# History

- เคยมีปัญหา recurrent cellulitis with lymphangitis 3 ครั้ง ได้นอนรักษา  
ในโรงพยาบาลศิริราช ที่แผนกศัลยกรรมทุกครั้ง คือ

1) 9 เดือนก่อน มีไข้สูง ชาขวาเจ็บ บวมแดง ร้อน มา 1 วัน รักษาด้วย  
Meropenem และ Vancomycin นาน 14 วัน (Hemoculture : no growth)

2) 7 เดือนก่อน มีไข้สูง ชาขวาเจ็บ บวมแดง ร้อน มา 1 วัน รักษาด้วย  
Ceftriaxone และ Vancomycin นาน 8 วัน แล้วให้รับประทาน Cephalexin  
ต่อจนครบ 14 วัน (Hemoculture : no growth)

3) 2 เดือนก่อนมีไข้สูง ชาขวาเจ็บ บวมแดง ร้อน มา 1 วัน รักษาด้วย  
Ceftriaxone และ Clindamycin นาน 6 วัน แล้วให้รับประทาน Cefdinir และ  
Clindamycin ต่ออีกจนครบ 14 วัน (Hemoculture : no growth)