



Revisited vaccine preventable disease: from the programme management side

Piyanit Tharmaphornpilas MD MPH

(รามา รุ่น 18 แพทย์ใช้ทุน รุ่น 17)



หมอบรัดเลย์

การปลูกฝีในปี 2445



Cold chain โบราณ

-ใส่ตุ่มน้ำดินเผา

-หมกข้างตุ่มน้ำ

-ยัดใส่ในหยวกกล้วย

ตารางที่ 6-1 ช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีนในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของ
กระทรวงสาธารณสุข

วัคซีน	อายุของกลุ่มเป้าหมาย
BCG	แรกเกิด
HB	แรกเกิด, 1 เดือน เฉพาะรายที่เด็กคลอดจากมารดาที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบี
DTP-HB	2 เดือน, 4 เดือน, 6 เดือน
OPV	2 เดือน, 4 เดือน, 6 เดือน, 18 เดือน, 4-6 ปี
DTP	18 เดือน และ 4-6 ปี
dT	- 12-16 ปี (ป.6) หลังจากนั้นกระตุ้นทุก 10 ปี - หญิงมีครรภ์ ถ้ายังไม่เคยได้รับวัคซีนในวัยเด็กให้ฉีดตามกำหนด 0, 1, 6 เดือน และกระตุ้นทุก 10 ปี
MMR	9-12 เดือน, 2 ½ ปี
JE	18 เดือน (2 เข็มห่างกัน 4 สัปดาห์) และ 2 ½ ปี (1 ปีหลังเข็มสอง)

+ influenza

ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2556
สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค


MMR

MMR1 อายุ 9-12 เดือน - คงเดิม

MMR2 อายุ 2.5 ปี – ปรับจากอายุ 7 ปี (ป.1)

ทำไม MMR1 คงไว้ที่ 9 เดือน

สัดส่วนผู้ป่วยยืนยันโรคหัด ปี 2555



เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี	
อายุ(เดือน)	จำนวน
0	1
1	1
2	3
3	6
4	2
5	7
6	4
7	14
8	18
9	20
10	9
11	9
Grand Total	94